ප්‍රශ්න අංකය			නිර්දේශ විද්‍යාව		ලකුණු			අවසාන ලකුණු
5.	(b)		පැත්තකට හිඳ x_1 ද අඳින ලදහි.					
		(i)	ගැලපෙන හිඳ $= \sin^{-1}(3x+2)$		1	①		
			$3x+4(3x+2)=98$		1			
			$3x+12x+8=98$					
			$15x = 90$		1			
			$x = 6$		1			
		(ii)	ගැලපෙන හිඳ $= \sin^{-1} 20$		1	①	△	$x = 6$ සඳහාවලංගුයි
							10	
5.	(a)	(i)	$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$		1			
			සහ $BC = \frac{AB}{\sin C}$		1			
			සහ $BE = \frac{AB}{50}$					
			$0.3191 = \frac{AB}{50}$		1	①		
			$\therefore AB = 15.955$ m		1			
			$\therefore AB = 16$ m (නිවැරදි දශමස්ථාන 2)		1	①		
		(ii)	$AB = \frac{AC}{\sin 90^\circ}$		1			
			$= \frac{50}{\sin 72^\circ}$					
			සහ $ADE = \frac{50}{\sin 72^\circ}$		1			
			$= 0.6667$					
			$ADE = 41^\circ 48'$		1	①	△	
	(b)							
			$AC^2 = 6^2 + BC^2$		1			
			$= 6^2 + 20^2$		1			
			$AC = \sqrt{436}$ m			①	△	
			$= 20.9$ m				10	

[ඉංග්‍රීසි පිටුව බලන්න]

ප්‍රශ්න අංකය			නිර්දේශ විද්‍යාව			ලකුණු			අවසාන ලකුණු
6.									
			කාලාන්තර මධ්‍යකය x	සංඛ්‍යාත ඝනත්වය fx					
			100 - 140	120	2	240			
			140 - 180	160	5	800			
			180 - 220	200	3	600			
			220 - 260	240	5	1200			
			260 - 300	280	3	840			
			300 - 340	320	1	320			
			340 - 380	360	1	360			
			380 - 420	400	1	400			
					20	4760			
		(i)	Σfx : 240 - 760			1			
			සියයකගය	$= \frac{4760}{20}$		1+1			x නිවැරදි : 1 fx නිවැරදි : 1 Σfx : 1
				$= 238$			②		
		(ii)	මධ්‍යගත අපගමන $= 238 - 30$			1			
				$= 7140$			①		
		(iii)	ඉතින්, නව ගෙවුම් ප්‍රමාණය $= 1.2 \times$			1			
				$= 2000$					
			$\therefore$ ලාභය			1	①	△	
								10	
			(B කොටසයි)						
7.	(i)		සළුවක පළල x ම්.						
			x යන අගය $x + 7x = 31$			1			
			$\therefore x = 4$						
			$\Sigma_1 = x + (x+1) + x^2$			1			
			$47 = 3 + (n-1) 4$			1			
			$\therefore n = 12$			1			
			$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$			1			$S_n = \frac{n}{2}(a+l)$
			$S_{12} = \frac{12}{2}(2 \times 3 + 11 \times 4)$			1			$S_{12} = \frac{12}{2}(3+47)$
			$= 300$			1	①		$= 300$

[ඉංග්‍රීසි පිටුව බලන්න]

ප්‍රශ්න අංකය			නිර්දේශ විද්‍යාව		ලකුණු			අවසාන ලකුණු
8.	(iv)		$S_n = 465$		1			
			$465 = \frac{n}{2}(2 \times 3 + (n-1)4)$		1			
			$2n^2 + n - 465 = 0$		1			
			$(n-15)(2n+31) = 0$		1			
			$n = 15$ හෝ $n = -\frac{31}{2}$					
			$\therefore n \neq 0$ බැවින් $n = 15$		1	①	△	
							10	
	(i)		$AB = 7.5$ cm		1	①		
	(ii)		AB ට උරින් කෝණමිතිකය		2	②		
	(iii)		AB විෂ්කම්භය වන වෘත්තය අඳින්න		1			(කේ.වි) වෘත්තයක් ඇඳගැනීම.
			$AF = 6$ cm වන AF ඊ.ඡේදය ඇඳීම		1			
			$FB = 4.5$ cm		1	①		
	(iv)		AB ට සාපේක්ෂව වෘත්තයේ තැන් Q වන ලක්ෂ්‍ය		2	②		
	(v)		$AQB = 90^\circ$ වෙනස්, AB විෂ්කම්භය වන වෘත්තය මත Q පිහිටිය හැකිය.		2	②	△	
							10	

[ඉංග්‍රීසි පිටුව බලන්න]

ප්‍රශ්න අංකය			නිර්දේශ විද්‍යාව		ලකුණු			අවසාන ලකුණු
9.	(a)	(i)	$\xi = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$		1			
			$P = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$		1			P යනු Q හි නිරාවුට් පිටපත
			$R = \{1, 3, 6, 10, 15\}$		1			R නිරාවුට් පිටපත
			$P \cap Q = \{5, 15\}$		1	①		
			$n(P \cap Q) = 2$				△	
			$(R \cup Q) \cap P = \{2, 4, 8, 12, 14, 16, 18\}$		1	①		
		(ii)	ගෙදර සිටියේ වරින් වර ඇසෙන A හා C රේඛාවේ සිටියේ සමානව ඇසෙන බවයි.		2	②		
		(iii)	සිටියේ රේඛා ඉතාම ඇසෙන බවයි.		1	①		
		(iv)	C රේඛාවේ සිටියේ ඇසිය හැකි සංඛ්‍යාව $= 20 - 5$					
			$= 15$					
			$\therefore$ ගේ රේඛාවේ සමානව ඇසිය හැකි සංඛ්‍යාව $= 15$		1	①	△	
			රේඛා ඉතාම ඇසිය හැකි බවයි. $\therefore n = 5$		1	①	10	
10.	(a)	(i)	ඇත්ත දේවල් සඳහා $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$		1	①		
			$= 4\omega / 1$					
			ඇත්ත හරහ නම් වේගය $= 30 + \frac{1}{2} \times a'$		1	①		
			$\therefore 4\omega / 1 = 40\omega /$		1			
			$\therefore 1 = 10\omega$					
		(b)	$A = \frac{(0.235)^2 \times 22.7}{0.135}$		1			ග්‍රෑම් නිරාවුට් ප්‍රමාණයෙන් කියවීම
			මුළු $A = 2(g\ 0.235 + g\ 22.7 - \frac{1}{2} g\ 0.16$		1			
			$= 2 \times 7.3711 \times 1.8615 - \frac{1}{2} \times 0.0117$		1			ඉන් එකක් නිවැරදි නම් ලකුණු
			$= 2.7422 \times 1.8615 - 0.4559$		1			
			$= 0.1478$		1			
			$A = 1.405$		1			
			$= 1.41$		1	①	△	
							10	

[ඉංග්‍රීසි පිටුව බලන්න]

ප්‍රශ්න අංකය			නිර්දේශ විද්‍යාව		ලකුණු			අවසාන ලකුණු
11.								
	(i)		රූපය		1	①		
	(ii)		දත්තය : $C\hat{D}P = P\hat{A}B$					
			$AC = CP$					
			මතු කළ ලක්ෂ්‍ය $AB \cap CP$ හා.					
			මතු කරන : $C\hat{P}A = P\hat{A}B$ (දත්තයට)		1			
			$C\hat{D}A = C\hat{A}D$ ($AC = CP$ ලෙස)					
			$\therefore P\hat{A}B = C\hat{P}A$		1			
			$AB \parallel CP$ (ඒකාන්තර කෝණ සමාන වේ)					
	(iii)		$A\hat{C}B = P\hat{C}Q$					
			මතු කළ ලක්ෂ්‍ය $AC \cap PQ$ හා.					
			මතු කරන : $AC = PQ$ බැවින්					
			$AC = CP$ (දත්තයට)		1			
			$\therefore AC = PQ$ (දත්තයට)					
			$AC = CQ$ (වෘත්තයේ අරයට)		1	①		
			$\therefore \Sigma$ AQC ද Δ CPQ ද සමද ලෙස සලකා ගත හැකිය.					
			$AQ = PQ$ බැවින්					
	(iv)		ΔBPC වලදාගැනේ,					
			$AQ = QP$ (AC හා PQ ට සැයින්)					
			$CQ = QB$ (දත්තයට)					
			$\therefore$ ABPC චතුරස්‍රයෙහි, විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය කරන බැවින්		1	①		
	(v)		ඉංජිනේරු සමාන්තරාස්‍රයේ AC හා BD කර්ණ පිටින් සෑම විටම විෂ්කෙරෙ දෙමින් බැවින්		1	①	△	
							10	

[ඉංග්‍රීසි පිටුව බලන්න]

ප්‍රශ්න අංකය			නිර්දේශ විද්‍යාව		ලකුණු			අවසාන ලකුණු
12.								
	(i)		රූපය : PQR වෘත්තයයි.		1			
			විශාල වෘත්තයේ QC හා QD යනු, A හා B BE ඇති ලක්ෂ්‍ය සම්බන්ධ කරයි.					
			මතු කළ ලක්ෂ්‍ය : $AB \cap CD$					
			මතු කරන : $P\hat{B}A = Q\hat{D}C$ ඒකාන්තර කෝණ සමාන වේ.		1			
			$P\hat{Q}D = Q\hat{D}C$ (විශාල වෘත්තයේ වෘත්තාභ්‍යන්තර කෝණය එයට ආසන්න වෘත්තාභ්‍යන්තර කෝණයට සමාන වේ.)					
			$\therefore P\hat{B}A = P\hat{Q}D$					
			නමුත්, $P\hat{Q}D + Q\hat{P}B$ (විශාල වෘත්තයේ වෘත්තාභ්‍යන්තර කෝණය එයට ආසන්න වෘත්තාභ්‍යන්තර කෝණයට සමාන වේ.)					
			$\therefore Q\hat{P}B = Q\hat{D}C$					
			$\therefore AB \parallel CD$ (ඒකාන්තර කෝණ සමාන වේ.)		1	①		
	(ii)		රූපය : $QC = QD$					
			මතු කළ ලක්ෂ්‍ය : $ACDB$ වෘත්ත චතුරස්‍රයේ ඇත.					
			මතු කරන : $Q\hat{C}D + C\hat{B}Q$ ($QC = QD$ බැවින්)					
			නමුත්, $Q\hat{A}B + Q\hat{C}D$ (චක්‍රීය චතුරස්‍රය සඳහා සලකා)					
			$\therefore Q\hat{A}B = C\hat{B}Q$					
			$ACDB$ වෘත්ත චතුරස්‍රයේ, $Q\hat{A}B$ බාහිර කෝණය = $C\hat{B}Q$ අභ්‍යන්තර කෝණයට සමාන බැවින්		1	①		

[ඉංග්‍රීසි පිටුව බලන්න]

ප්‍රශ්න අංකය			නිර්දේශ විද්‍යාව		ලකුණු			අවසාන ලකුණු
	(iii)		රූපය : AB ඇඳ CD වෘත්තයට විෂ්කම්භයක් $AC = DQ$					
			විශාල වෘත්තයේ AC හා CD වලට විෂ්කම්භයක් ඇඳ AB ද CD වෘත්තයේ ඇඳ BE					
			මතු කළ ලක්ෂ්‍ය : $AB \cap CD$					
			මතු කරන : $A\hat{C}D = 90^\circ$ (AC යනු CD වෘත්තයට විෂ්කම්භයක් බැවින්)					
			$\therefore C\hat{D}B = 90^\circ$					
			CD වෘත්තය විෂ්කම්භයක් ඇඳ,					
			වෘත්තය මත ඇතැම් ලක්ෂ්‍යය 90° බැවින්,					
			සහ ΔABD ද ΔQDB ද, සමකෝණී බැවින්,					
			$\frac{AD}{QB} = \frac{AB}{DB}$					
			$\frac{AD}{QB} = \frac{2R}{x}$		1	①		
			ඇරා වෘත්තයේ අරය r ලෙස, $AB = 2r$					
			හා විශාල වෘත්තයේ අරය r ලෙස $CD = 2r$					
			$\therefore \frac{AC + DQ}{QB} = \frac{2r}{x}$		1	①	△	
			$\therefore x = 2r$				10	

[ඉංග්‍රීසි පිටුව බලන්න]