



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2018

10 - සිංදුක්ත ගණිතය I

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
පරීක්ෂක සාකච්ඡා පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. වැරදි හෝ ත්‍රස්‍යුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අඳින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඔවර්ලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
3. සෑම ප්‍රශ්නයකටම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.
4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණු ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

මෙවර සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු ලකුණු ලැයිස්තුවේ "I වන පත්‍රය" තීරුවේ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න. අදාළ විෂයේ ලකුණු ඇතුළත් කර "II වන පත්‍රය" තීරුවේ II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු ඇතුළත් කරන්න. 51 විභූ විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.

1. ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය භාවිතයෙන්, සියලු $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $\sum_{r=1}^n r^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$ බව සාධනය කරන්න.

$n=1$ විට, ව:පැ: $= 1^3 = 1$ හා ද:පැ: $= \frac{1}{4} \cdot 1^2(1+1)^2 = 1$. (5)

$\therefore n=1$ විට ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ.

ඕනෑම $p \in \mathbb{Z}^+$ ගෙන $n=p$ විට ප්‍රතිඵලය සත්‍ය යැයි සිතමු.

එනම්, $\sum_{r=1}^p r^3 = \frac{1}{4}p^2(p+1)^2$. (5)

දැන් $\sum_{r=1}^{p+1} r^3 = \sum_{r=1}^p r^3 + (p+1)^3$ (5)

$= \frac{1}{4}p^2(p+1)^2 + (p+1)^3$


$= (p+1)^2 \frac{[p^2 + 4p + 4]}{4}$

$= \frac{1}{4}(p+1)^2(p+1+1)^2$. (5)

එනමින් $n=p$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ නම්, $n=p+1$ සඳහා ද ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ. අපි දැනටමත් $n=1$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය බව පෙන්වා ඇත. එනමින් ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය මගින් සියලු $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ. (5)

2. එක ම රූප සටහනක $y = 3 - |x|$ හා $y = |x - 1|$ හි ප්‍රස්ථාරවල දළ සටහන් අඳින්න.

එ සටහන් හෝ අන් අයුරකින් හෝ, $|x| + |x - 1| \leq 3$ අසමානතාව සපුරාලන x හි සියලු ම ආස්න්නීති අගයන් සොයන්න.



පේදන ලක්ෂ්‍යය වලදී $-x + 1 = 3 + x$ හෝ $x - 1 = 3 - x$

එනම්, $x = -1$ හෝ $x = 2$. (5)

තවද, $|x| + |x - 1| \leq 3$

$\Leftrightarrow |x - 1| \leq 3 - |x|$ (5)

එනමින්, ප්‍රස්ථාරයෙන්, විසඳුම් $-1 \leq x \leq 2$ තෘප්ත කරන x අගයන් වේ.

(5)

25

වෙනත් ක්‍රමයක්

$|x| + |x - 1| \leq 3$

(i) අවස්ථාව $x \leq 0$: $|x| + |x - 1| \leq 3 \Leftrightarrow -x - (x - 1) \leq 3$

$\Leftrightarrow -2x + 1 \leq 3$ (5)

$\Leftrightarrow x \geq -1$

මෙම අවස්ථාව සඳහා විසඳුම් $-1 \leq x \leq 0$ තෘප්ත කරන x අගයන් වේ.

(ii) අවස්ථාව $0 < x \leq 1$

$$|x| + |x-1| \leq 3$$

$$\Leftrightarrow x - (x-1) \leq 3$$

$$\Leftrightarrow x - (x-1) \leq 3$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq 3$$

මෙම අවස්ථාව සඳහා විසඳුම් $0 < x \leq 1$ වේ.

5

(iii) අවස්ථාව $1 < x$

$$|x| + |x-1| \leq 3$$

$$\Leftrightarrow x + x - 1 \leq 3$$

$$\Leftrightarrow 2x \leq 4$$


$$\Leftrightarrow x \leq 2$$

\therefore මෙම අවස්ථාව සඳහා විසඳුම් $1 < x \leq 2$ වේ.

එනමින් විසඳුම් $-1 \leq x \leq 2$ තෘප්ත කරන x අගයන් වේ.

5

3. අනන්ත සටහනක, $\text{Arg}(z - 3i) = -\frac{\pi}{3}$ සමුරාලන z සංකීර්ණ සංඛ්‍යා තීරුවකට කරන ලක්ෂ්‍යවල පරිමාණ දළ සටහනක් අඳින්න.
 ඒ නිසි හෝ අක්ෂරවලින් හෝ, $\text{Arg}(\bar{z} + 3i) = \frac{\pi}{3}$ වන පරිදි $|z - 1|$ හි අවම අගය සොයන්න.



$$\text{Arg}(\bar{z} + 3i) = \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}(\overline{z + 3i}) = -\frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}(z - 3i) = -\frac{\pi}{3}$$

(5)

එනිසා, $\text{Arg}(\bar{z} + 3i) = \frac{\pi}{3}$ වන පරිදි $|z - 1|$ හි අවම අගය NM දෙනු ලබයි.

(5)

$$\text{මෙහි } NM = (\sqrt{3} - 1) \sin \frac{\pi}{3} = \frac{(3 - \sqrt{3})}{2}$$

(5)

25

4. $\left(x^2 + \frac{3k}{x}\right)^8$ හි ද්විතීය ප්‍රකාරයෙන් x හා x^4 හි සංගුණක සමාන වේ. k නියතයෙහි අගය සොයන්න.

$$\begin{aligned} \left(x^2 + \frac{3k}{x}\right)^8 &= \sum_{r=0}^8 {}^8C_r (x^2)^r \left(\frac{3k}{x}\right)^{8-r} && (5) \\ &= \sum_{r=0}^8 {}^8C_r (3k)^{8-r} x^{3r-8} \end{aligned}$$

$$x^1 : 3r - 8 = 1 \Leftrightarrow r = 3. \quad (5)$$

$$x^4 : 3r - 8 = 4 \Leftrightarrow r = 4.$$

$$\text{දක්නටයන්න } {}^8C_r (3k)^5 = {}^8C_4 (3k)^4 \quad (5)$$

$$\frac{8!}{3!5!} 3^5 k = \frac{8!}{4!4!} 3^4 \quad (5)$$

$$k = \frac{5}{12}. \quad (5)$$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{x^2(x+1)} = \frac{\pi^2}{32}$ බව පෙන්වන්න.


$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{x^2(x+1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{8}\right)}{x^2(x+1)} && (5) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi x}{8}\right)}{\left(\frac{\pi x}{8}\right)} \right]^2 \cdot \frac{\pi^2}{64} \cdot \frac{1}{x+1} \\ &= 2 \cdot 1 \cdot \frac{\pi^2}{64} \cdot \frac{1}{1} && (5) \quad (5) \\ &= \frac{\pi^2}{32} && (5) \end{aligned}$$

25

වෙනත් ක්‍රමයක්

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{x^2(x+1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{x^2(x+1)} \cdot \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{1 + \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{x^2(x+1)\left(1 + \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)\right)} && (5) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{\left(\frac{\pi x}{4}\right)} \right]^2 \cdot \frac{\pi^2}{16} \cdot \frac{1}{x+1} \cdot \frac{1}{1 + \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)} \\ &= 1 \cdot \frac{\pi^2}{16} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} && (5) \quad (5) \\ &= \frac{\pi^2}{32} && (5) \end{aligned}$$

6. $y = e^{2x}$, $y = e^{3-x}$, $x = 0$, $x = 3$ හා $y = 0$ වල මගින් ආවරණය වූ කලාපයේ වර්ගඵලය, වර්ග ඒකක $\frac{3}{2}(e^2 - 1)$ බව පෙන්වන්න.



$$\int_0^1 e^{2x} dx + \int_1^3 e^{3-x} dx = \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 + \frac{e^{3-x}}{(-1)} \Big|_1^3$$

$$= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} + (-1) + e^2$$

$$= \frac{3e^2}{2} - \frac{3}{2}$$

$$= \frac{3}{2}(e^2 - 1).$$

25

7. $\frac{\pi}{2} < t < \pi$ සඳහා $x = \ln\left(\tan \frac{t}{2}\right)$ හා $y = \sin t$ පරාමිතික සමීකරණ මගින් C වක්‍රයක් ලෙස ලැබේ.

$\frac{dy}{dx} = \cos t \sin t$ බව පෙන්වන්න.

$t = \frac{2\pi}{3}$ ට අනුරූප ලක්ෂ්‍යයෙහි දී C වක්‍රයට ඇදී යාමට පෙරහැරෙහි අනුක්‍රමණය $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ බව අපෝකාසනය කරන්න.

$$x = \ln\left(\tan \frac{t}{2}\right)$$

$$y = \sin t$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\tan \frac{t}{2}} \times \sec^2 \frac{t}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{dy}{dt} = \cos t$$

5

5

$$= \frac{1}{2 \cos \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2}} \quad (5)$$

$$= \frac{1}{\sin t}$$


ඇත් $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \cos t \sin t \quad (5)$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

(5)

25

8. l_1 යනු $x + y - 5 = 0$ සරල රේඛාව යැයි ගනිමු. $P \equiv (3, 4)$ ලක්ෂ්‍යය හරහා යන හා l_1 ට ලම්බ වූ l_2 සරල රේඛාවෙහි සමීකරණය සොයන්න.
- Q යනු l_1 හා l_2 හි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය යැයි ද R යනු $PQ : QR = 1 : 2$ වන පරිදි l_2 මත වූ ලක්ෂ්‍යය යැයි ද ගනිමු. R හි ඛණ්ඩාංක සොයන්න.



l_2 හි අනුක්‍රමණය $= -\frac{1}{-1} = 1 \quad (5)$

l_2 සමීකරණය : $y - 4 = 1(x - 3)$

$x - y + 1 = 0 \quad (5)$

(5)

$Q \equiv (2, 3)$

$R \equiv (x_0, y_0)$ යයි ගනිමු.

එවිට,

$2 = \frac{x_0 + 6}{3}$ සහ $3 = \frac{y_0 + 8}{3} \quad (5)$

වෙනත් ක්‍රමයක් (5)

$\frac{QR}{RP} = -\frac{2}{3}$ බැවින්

$$R \equiv \left(\frac{-2 \times 3 + 2 \times 3}{3 - 2}, \frac{-2 \times 4 + 3 \times 3}{3 - 2} \right)$$

$= (0, 1)$ (5)

$$= 4 \left[\left(a - \frac{b}{2} \right)^2 + \frac{3b^2}{4} \right] \geq 0 \text{ for all } a, b \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

(5)

ඒ නයිත්, මූල කාන්තවික වේ.

(5)

25

$$\alpha + \beta = \frac{2}{3}(a + b) \quad \alpha\beta = \frac{ab}{3}$$

(5)

(5)

$$\beta = \alpha + 2 \Rightarrow (\beta - \alpha)^2 = 4$$

(5)

$$\Rightarrow (\beta + \alpha)^2 - 4\alpha\beta = 4$$

(5)

$$\Rightarrow \frac{4}{9}(a + b)^2 - \frac{4}{3}ab = 4$$

(5)

(5)

$$\Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 - 3ab = 9$$

$$\Rightarrow a^2 - ab + b^2 = 9$$

(5)

35

$$b^2 - ab + a^2 = 9$$

$$\Rightarrow \left(b - \frac{a}{2} \right)^2 = \frac{a^2}{4} - a^2 + 9$$

$$= -\frac{3a^2}{4} + 9$$

$$= \frac{3}{4}(12 - a^2) \quad (1)$$

$$\Rightarrow 12 - a^2 \geq 0$$

(5)

$$\Rightarrow |a| \leq \sqrt{12}$$

(5)

$$b = \frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{12 - a^2}$$

(10)

30

(b) $f(x) = x^3 + 4x^2 + cx + d$
 $f(-c) = -c^3 + 4c^2 - c^2 + d = -c^3$ (5)
 (5) $\Rightarrow 3c^2 + d = 0$ ----- (1)
 $f(c) = c^3 + 4c^2 + c^2 + d = 0$ (5)
 (5) $\Rightarrow c^3 + 5c^2 + d = 0$ ----- (2)
 (2) - (1) මගින් $c^3 + 2c^2 = 0$ ලැබේ. (5)
 $\Rightarrow c^2(c + 2) = 0$
 $c \neq 0$, නිසා $c = -2$. (5)
 $\Rightarrow d = -3c^2 = -12$. (5)

35

දැන් $f(x) = x^3 + 4x^2 - 2x - 12$.
 $f(x)$ යන්න $x^2 - 4$ මගින් බෙදූ විට ශේෂය $\lambda x + \mu$ ආකාරය ගනී.
 එනම් $f(x) = (x^2 - 4)q(x) + \lambda x + \mu$. (5)
 $\Rightarrow f(x) = (x - 2)(x + 2)q(x) + \lambda x + \mu$.
 $f(2) = 8 = 2\lambda + \mu$ හා $f(-2) = 0 = -2\lambda + \mu$
 (5) (5)
 $\Rightarrow \mu = 4$ හා $\lambda = 2$. (5) (5)
 \therefore ශේෂය $= 2x + 4$. (5)

25

12. (a) එක එකක පිරිමි ළමයින් සිද්දනු හා ගැහැනු ළමයින් දෙදෙනකු සිටින කණ්ඩායම් දෙකක සාමාජිකයා: අතුරෙන්, සාමාජිකයන් හතරදෙනකුගෙන් යුත් කමිටුවක් තෝරා ගත යුතුව ඇත්තේ කමිටුවේ සිටින ගැහැනු ළමයින් සංඛ්‍යාව එකී කරමින් දෙදෙනකු වන පරිදි ය.

- (i) කමිටුවට එක් එක් කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් තෝරා ගත යුතු නම්.
- (ii) කමිටුවට එක් ගැහැනු ළමයකු පමණක් තෝරා ගත යුතු නම්, හැදිය හැකි එවැනි වෙනත් කමිටු ගණන සොයන්න.

(b) $r \in \mathbb{Z}^+$ දෙසා $f(r) = \frac{1}{(r+1)^2}$ හා $U_r = \frac{(r+2)}{(r+1)^2(r+3)^2}$ ගැනී ගනිමු.

$r \in \mathbb{Z}^+$ දෙසා $f(r) - f(r+2) = 4U_r$ බව පෙන්වන්න.

එ සේම, $n \in \mathbb{Z}^+$ දෙසා $\sum_{r=1}^n U_r = \frac{13}{144} - \frac{1}{4(n+2)^2} - \frac{1}{4(n+3)^2}$ බව පෙන්වන්න.

$\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ අවසාන අවුලය අභිසාරී බව ඉස්මතුවා කර එහි වටිනාකම සොයන්න.

$n \in \mathbb{Z}^+$ දෙසා $f_n = \sum_{r=n}^{\infty} U_r$ ගැනී ගනිමු.

$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = 0$ බව පෙන්වන්න.

(a) (i)

තෝරිය හැකි වෙනත් ආකාර ගණන		කමිටු ගණන
1 කණ්ඩායම	2 කණ්ඩායම	
2	4	
1G 1B	1G 3B	$2 \times 3 \times 2 \times 1 = 12$
2B	1G 3B	${}^3C_2 \times 2 \times 1 = 6$
2B	2G 2B	${}^1C_2 \times {}^2C_2 \times {}^3C_2 = 9$
		27

- 10
- 10
- 10
- 5

\therefore වෙනත් කමිටු ගණන = 27×2
= 54

10

45

(ii) 1G 5B

10 ${}^4C_1 \times {}^6C_5 = 24$. 5

15

(i) වෙනත් ක්‍රමයක්

1 කණ්ඩායම		2 කණ්ඩායම		කමිටු ගණන
M(3)	F(2)	M(3)	F(2)	
2		2	2	${}^3C_2 \times {}^3C_2 \times {}^2C_2 = 9$
2		3	1	${}^3C_2 \times {}^3C_3 \times {}^2C_1 = 6$
1	1	3	1	${}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_3 \times {}^2C_1 = 12$
2	2	2		9
3	1	2		6
3	1	1	1	12

10
10
10
5

කමිටු ගණන: $9 + 6 + 12 + 9 + 6 + 12 = 54$

10

(b)

$$f(r) - f(r + 2) = \frac{1}{(r + 1)^2} - \frac{1}{(r + 3)^2} \quad (5)$$

$$= \frac{4(r + 2)}{(r + 1)^2(r + 3)^2} \quad (5)$$

$$= 4U_r \quad (5)$$

15

එවිට

$$r = 1; \quad 4U_1 = f(1) - f(3) \quad (10)$$

$$r = 2; \quad 4U_2 = f(2) - f(4)$$

$$r = 3; \quad 4U_3 = f(3) - f(5)$$

$$\vdots$$

$$r = n - 2; \quad 4U_{n-2} = f(n - 2) - f(n)$$

$$r = n - 1; \quad 4U_{n-1} = f(n - 1) - f(n + 1) \quad (10)$$

$$r = n; \quad 4U_n = f(n) - f(n + 2) \quad (10)$$

$$4 \sum_{r=1}^n U_r = f(1) + f(2) - f(n + 1) - f(n + 2) \quad (10)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{(n + 2)^2} - \frac{1}{(n + 3)^2}$$

$$\therefore \sum_{r=1}^n U_r = \frac{13}{144} - \frac{1}{4(n + 2)^2} - \frac{1}{4(n + 3)^2} \quad (10)$$

40

$n \rightarrow \infty$ විට ද. ප. හි සීමාව $\frac{13}{144}$ (5)

$$\therefore \sum_{r=1}^{\infty} U_r \text{ අභිසාරී වන අතර එකතුව } \frac{13}{144} \text{ වේ.} \quad (5)$$

15

$$t_n = \sum_{r=n}^{2n} U_r$$

$$= \sum_{r=1}^{2n} U_r - \sum_{r=1}^{n-1} U_r \quad (5)$$

$$\sum_{r=1}^{\infty} U_r \text{ අභිසාරී බැවින්}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^{2n} U_r - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^{n-1} U_r \quad (5)$$

$$= \frac{13}{144} - \frac{13}{144} \quad (5)$$

$$= 0. \quad (5)$$

20

13. (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ හා $B = \begin{pmatrix} 3 & 2a \\ -1 & 0 \\ 1 & 3a \end{pmatrix}$ යැයි ගනිමු; මෙහි $a \in \mathbb{R}$ වේ.

$P = AB$ මගින් අර්ථ දැක්වෙන P න්‍යාසය සොයා, a හි සිසිදු අගයකට P^{-1} ආසන්න බව පෙන්වන්න.

$$P \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ නම්, } a = 2 \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

a හඳුනා මෙම අගය සහිත ව, $Q = P + I$ යැයි ගනිමු; මෙහි I යනු ගණය 2 වන ඒකක න්‍යාසයයි.

$$Q^{-1} \text{ ප්‍රියා දක්වා } AA^T - \frac{1}{2}R = \left(\frac{1}{5}Q\right)^{-1} \text{ වන පරිදි } R \text{ න්‍යාසය සොයන්න.}$$

(b) $z = x + iy$ යැයි ගනිමු; මෙහි $x, y \in \mathbb{R}$ වේ. z හි, මාසාංකය $|z|$ හා ප්‍රතිබද්ධය \bar{z} අර්ථ දක්වන්න.

(i) $z\bar{z} = |z|^2$,

(ii) $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z$ හා $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z$

බව පෙන්වන්න

$$z \neq 1 \text{ හා } w = \frac{1+z}{1-z} \text{ යැයි ගනිමු. } \operatorname{Re} w = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} \text{ හා } \operatorname{Im} w = \frac{2 \operatorname{Im} z}{|1-z|^2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$$z = \cos \alpha + i \sin \alpha \quad (0 < \alpha < 2\pi) \text{ නම්, } w = i \cot \frac{\alpha}{2} \text{ බව තව දුරටත් පෙන්වන්න.}$$

(c) දෘශ්‍යවී සටහනක, A හා B ලක්ෂ්‍ය පිහිටවෙලින් $-3i$ හා 4 සංකීර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කරයි. C හා D ලක්ෂ්‍ය පළලුවන වන්න පාදකයේ පිහිටන්නේ $ABCD$ රොම්බසයක් හා $\hat{B}AD = \theta$ වන පරිදි ය; මෙහි $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{7}{25}\right)$ වේ. C හා D ලක්ෂ්‍ය මගින් නිරූපණය කරනු ලබන සංකීර්ණ සංඛ්‍යා සොයන්න.

(a) $P = AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2a \\ -1 & 0 \\ 1 & 3a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2a \\ 1 & a \end{pmatrix}.$

10

10

(b) $z = x + iy \quad x, y \in \mathbb{R}$

$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ සහ $\bar{z} = x - iy.$ 5 10

(i) $z \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2.$ 5

(ii) $z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x = 2 \operatorname{Re} z$ සහ 5

$z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy = 2i \operatorname{Im} z.$ 5 15

$z \neq 1$ නම් $w = \frac{1+z}{1-z} \times \frac{1-\bar{z}}{1-\bar{z}} = \frac{1-z\bar{z}+z-\bar{z}}{|1-z|^2} = \frac{1-|z|^2+2i \operatorname{Im} z}{|1-z|^2}$

$\Rightarrow \operatorname{Re} w = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}$ සහ $\operatorname{Im} w = \frac{2 \operatorname{Im} z}{|1-z|^2}$

20


$z = \cos \alpha + i \sin \alpha \quad (0 < \alpha < 2\pi).$

එවිට $|z| = 1 \Leftrightarrow \operatorname{Re} w = 0.$ 5

$\therefore w = \frac{2i \operatorname{Im} z}{|1-z|^2} = \frac{2i \sin \alpha}{(1-\cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha} = \frac{2i \sin \alpha}{2(1-\cos \alpha)} = i \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = i \cot \frac{\alpha}{2}.$

20

(c)



$\sin \theta = \frac{7}{25}, \quad (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow \cos \theta = \frac{24}{25}$

$D \equiv (a, b)$ යයි ගනිමු.

A වටා AB වාමාවර්තව භ්‍රමණය කිරීමෙන් AD ගත හැක.

$$\therefore a + i(b + 3) = (4 + 3i)(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$= (4 + 3i) \left(\frac{24}{25} + i \frac{7}{25} \right)$$

10

$$\Leftrightarrow a + i(b + 3) = 3 + 4i.$$

$$\Leftrightarrow a = 3 \text{ හා } b = 1.$$

$\therefore D$ මගින් $3 + i$ නිරූපණය කරයි.

05

$$C \equiv (p, q), \text{ නම්, } \frac{p+0}{2} = \frac{3+4}{2} \text{ හා } \frac{q-3}{2} = \frac{1+0}{2}.$$

$$\Rightarrow p = 7 \text{ හා } q = 4.$$

$\therefore C$ මගින් $7+4i$ නිරූපණය කරයි.

05

30

14. (a) $x \neq -1, \frac{1}{3}$ සඳහා $f(x) = \frac{16(x-1)}{(x+1)^3(3x-1)}$ යැයි ගනිමු.


$$x \neq -1, \frac{1}{3} \text{ සඳහා } f(x) \text{ හි ව්‍යුත්පන්නය, } f'(x) \text{ සඳහා } f'(x) = \frac{-32x(3x-5)}{(x+1)^3(3x-1)^2} \text{ මගින් දෙනු ලබන}$$

මච පෙන්වන්න.

ස්වල්මෙන්මුඛ හා හැරුම් ලක්ෂණ දක්වමින් $y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් අඳින්න.

ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන්, $k(x+1)^2(3x-1) = 16(x-1)$ සමීකරණයට තරියටම එක් මූලයක් පවතින පරිදි $k \in \mathbb{R}$ හි අගයන් සොයන්න.

(b) අරය $3r$ cm හා උස $5h$ cm වන සංඛාන කුහරයක් සාදනු වන්න සිලින්ඩරයක් උඩින් මුහුණකින් අරය r cm වන කැටයක් ඉවත් කර, අරය r cm හා උස h cm වන විවෘත කුහරයක් සාදනු වන්න සිලින්ඩරයක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සවිකර 391π cm³ ක පරිමාවක් සහිත මෝනලයක් සාදා ගත යුතු වේ. මෝනලයේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය S cm² යන්න $S = \pi r (32h + 17r)$ බව දී ඇත. S අවම වන පරිදි r හි අගය සොයන්න.



(a) $x \neq -1, \frac{1}{3}$ සඳහා; $f(x) = \frac{16(x-1)}{(x+1)^2(3x-1)}$

එවිට

$$f'(x) = \frac{16(x+1)^2(3x-1) - 16(x-1)[2(x+1)(3x-1) + 3(x+1)^2]}{(x+1)^4(3x-1)^2}$$

$$= \frac{16(x+1)[(x+1)(3x-1) - 2(x-1)(3x-1) - 3(x-1)(x+1)]}{(x+1)^4(3x-1)^2}$$

15

$$= \frac{-32x(3x-5)}{(x+1)^3(3x-1)^2}; \left(x \neq -1, \frac{1}{3}\right).$$

10

25

තිරස් ස්පර්ශකයන්ගේ මූලය : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, එවිට $y = 0$.

5

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) \rightarrow \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}^-} f(x) \rightarrow \infty \text{ සහ } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}^+} f(x) \rightarrow -\infty.$$

සිරස් ස්පර්ශකයන්ගේ මූලය : $x = -1$ සහ $x = \frac{1}{3}$.

5

හැරුම් ලක්ෂ්‍ය වලදී $f'(x) = 0$. $\Leftrightarrow x = 0$ හෝ $x = \frac{5}{3}$.

	$-\infty < x < -1$	$-1 < x < 0$	$0 < x < \frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} < x < \frac{5}{3}$	$\frac{5}{3} < x < \infty$
$f'(x)$ ලකුණ	(+)	(-)	(+)	(+)	(-)
	f ඒකවිධ ලෙස වැඩිවේ	f ඒකවිධ ලෙස අඩුවේ	f ඒකවිධ ලෙස වැඩිවේ	f ඒකවිධ ලෙස වැඩිවේ	f ඒකවිධ ලෙස අඩුවේ

5

5

5


5

5

හැරුම් ලක්ෂ්‍ය : $(0,16)$ ස්ථානීය අවමයක් සහ $\left(\frac{5}{3}, \frac{3}{8}\right)$ ස්ථානීය උපරිමයක්.

5

5



60

$$k(x + 1)^2(3x - 1) = 16(x - 1).$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{16(x - 1)}{(x + 1)^2(3x - 1)} \quad (5)$$

$k \leq 0$ හෝ $\frac{3}{8} < k < 16$ මතම පමණක් දෙන ලද සමීකරණයට හරියටම එක් මූලයක් පමණක් පවතී. (5) (5)

15

(b) පරිමාව: $391\pi = \pi(3r)^2(5h) + \pi r^2 h$

$$\Rightarrow 391 = 46r^2 h$$

$$\Rightarrow h = \frac{17}{2r^2}, \quad (r > 0). \quad (5) \quad (10)$$

පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය: $S = \pi r(32h + 17r).$

$$= 17\pi \left(\frac{16}{r} + r^2 \right) \quad (5)$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{dS}{dr} = 17\pi \left(-\frac{16}{r^2} + 2r \right) = \frac{34\pi(r^3 - 8)}{r^2} \quad \textcircled{5}$$

$$\frac{dS}{dr} = 0 \Leftrightarrow r = 2. \quad \textcircled{5}$$

$0 < r < 2$ විටදී $\frac{dS}{dr} < 0$ සහ $r > 2$ විටදී $\frac{dS}{dr} > 0$.

$\textcircled{5}$

$\textcircled{5}$

$\therefore r = 2$ විටදී S අවම වේ.

$\textcircled{5}$

50

15. (a) (i) x^2, x^1 හා x^0 හි සංගුණක සැසඳීමෙන්,

සියලු $x \in \mathbb{R}$ සඳහා $Ax^2(x-1) + Bx(x-1) + C(x-1) - Ax^3 = 1$ වන පරිදි A, B හා C නියතවල අගයන් සොයන්න.

එ නිසා $\frac{1}{x^3(x-1)}$ හි නින්නා භාග වලින් ලියා දැක්වීම $\int \frac{1}{x^3(x-1)} dx$ සොයන්න.

(ii) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතයෙන් $\int x^2 \cos 2x dx$ සොයන්න.

(b) $\theta = \tan^{-1}(\cos x)$ ආදේශය භාවිතයෙන් $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx = 2 \ln(1+\sqrt{2})$ බව පෙන්වන්න.

a නියතයක් වන $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ සත්‍ය භාවිතයෙන් $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx$ සොයන්න.

(a) (i) $Ax^2(x-1) + Bx(x-1) + C(x-1) - Ax^3 = 1$

සංගුණක සැසඳීමෙන්:

$x^2 : -A + B = 0$ (5)

$x^1 : -B + C = 0$ (5)

$x^0 : -C = 1$ (5)

$A = -1, B = -1$ and $C = -1$ (5)

20

$1 = -x^2(x-1) - x(x-1) - (x-1) + x^3$

$\therefore \frac{1}{x^3(x-1)}$ හි නින්නා භාග ඇසුරින්:

$\frac{1}{x^3(x-1)} = -\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x-1}$ ලෙස වේ. (5)

එනිසා $\int \frac{1}{x^3(x-1)} dx = -\int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x^2} dx - \int \frac{1}{x^3} dx + \int \frac{1}{x-1} dx$

$= -\ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \ln|x-1| + C$, (5)

(5) (5) (5) (5)

මෙහි C යනු අභිමත නියතයක් වේ.

30

(ii) $\int x^2 \cos 2x dx = \frac{x^2 \sin 2x}{2} - \frac{1}{2} \int 2x \sin 2x dx$ (5)

$= \frac{x^2 \sin 2x}{2} + \frac{x \cos 2x}{2} - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx$ (5)

(5)

$$= \frac{x^2 \sin 2x}{2} + \frac{x \cos 2x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C, \text{ මෙහි } C \text{ යනු අභිමත නියතයක් වේ.}$$

30

(b) $\theta = \tan^{-1}(\cos x); -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

$\tan \theta = \cos x \Rightarrow \sec^2 \theta d\theta = -\sin x dx$

$x = 0 \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(1) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

$x = \pi \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(-1) \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$

$\int_0^\pi \frac{\sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx = -\int_{\frac{\pi}{4}}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 \theta}{\sqrt{\sec^2 \theta}} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sec \theta d\theta$ ($\sqrt{\sec^2 \theta} = \sec \theta$ as $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$)

$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec \theta (\sec \theta + \tan \theta)}{(\sec \theta + \tan \theta)} d\theta$

$= \ln|\sec \theta + \tan \theta| \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}$

$= \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln(\sqrt{2} - 1)$

$= \ln \left(\frac{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} \right)$

$= 2 \ln(\sqrt{2} + 1).$

50

$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi-x) \sin(\pi-x)}{\sqrt{1+\cos^2(\pi-x)}} dx$

$= \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx - \int_0^\pi \frac{x \sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx$

$\Rightarrow I = \pi [2 \ln(\sqrt{2} + 1)] - I$

$\Rightarrow 2I = 2 \pi \ln(\sqrt{2} + 1)$

$\Rightarrow I = \pi \ln(\sqrt{2} + 1).$

20

16. $A \equiv (-2, -3)$ හා $B \equiv (4, 5)$ පෑසි ගනිමු. AB රේඛාව සමඟ l_1 හා l_2 රේඛා එක එකක් සාදන සුළු කෝණය $\frac{\pi}{4}$ වන පරිදි A ලක්ෂ්‍යය හරහා යන l_1 හා l_2 රේඛාවල සමීකරණ සොයන්න.


P හා Q ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙලින් l_1 හා l_2 මත ගෙන ඇත්තේ $APBQ$ සම්චතුරස්‍රයක් වන පරිදි ය. PQ හි සමීකරණය සොයා, P හා Q හි ඛණ්ඩාංක සොයන්න.

තව ද A, P, B හා Q ලක්ෂ්‍ය හරහා යන S වෘත්තයේ සමීකරණය සොයන්න.

$\lambda > 1$ පෑසි ගනිමු. $R \equiv (4\lambda, 5\lambda)$ ලක්ෂ්‍යය, S වෘත්තයට පිටතින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.

R ලක්ෂ්‍යයේ සිට S වෘත්තයට ඇඳි ස්පර්ශකවල ස්පර්ශ ජ්‍යායේ සමීකරණය සොයන්න.

$\lambda (> 1)$ පිටලනය වන විට, මෙම ස්පර්ශ ජ්‍යායන් අවල ලක්ෂ්‍යයක් හරහා යන බව පෙන්වන්න.



$$\tan \frac{\pi}{4} = \left| \frac{m - \frac{4}{3}}{1 + \frac{4m}{3}} \right| \quad (10)$$

$$\Rightarrow \left(m - \frac{4}{3}\right)^2 = \left(1 + \frac{4m}{3}\right)^2 \quad (5)$$

$$\Rightarrow 7m^2 + 48m - 7 = 0$$

$$\Rightarrow (7m - 1)(m + 7) = 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{1}{7} \text{ or } m = -7.$$

$$(5)$$

$$(5)$$

∴ අවශ්‍ය සමීකරණ වන්නේ:

(i) $y + 3 = \frac{1}{7}(x + 2) \Rightarrow x - 7y - 19 = 0$, (10)

සහ

(ii) $y + 3 = -7(x + 2) \Rightarrow 7x + y + 17 = 0$. (10)

45

l_1 යනු $x - 7y - 19 = 0$ රේඛාව සහ අනෙක l_2 යැයි ගනිමු.

PQ හි සමීකරණය: $y - 1 = -\frac{3}{4}(x - 1) \Rightarrow 3x + 4y - 7 = 0$ (10)

l_1 සහ PQ හි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය: $P = (5, -2)$ (5)

$Q = (x_0, y_0)$ නම්,

$$\frac{5 + x_0}{2} = 1 \Rightarrow x_0 = -3$$
 (5)

$$\frac{-2 + y_0}{2} = 1 \Rightarrow y_0 = 4$$

$Q \equiv (-3, 4)$. (5)

25

A, P, B හා Q ලක්ෂ්‍ය හරහා යන වෘත්තය AB විෂ්කම්භය ලෙස ඇති වෘත්තය වේ. (10)

$(y - 5)(y + 3) + (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$

(10)

20

$CR^2 = (4\lambda - 1)^2 + (5\lambda - 1)^2$ හා වෘත්තයේ අරය 5 වේ. (10)

ඇත් $CR^2 - 25 = (4\lambda - 1)^2 + (5\lambda - 1)^2 - 25$ (5)

$= 41\lambda^2 - 18\lambda - 23$

$= (\lambda - 1)(41\lambda + 23) > 0$ as $\lambda > 1$. (10)

∴ R ලක්ෂ්‍යය වෘත්තයට පිටතින් පිහිටයි. (5)

30

අවශ්‍ය ස්පර්ශ ජායයේ සමීකරණය

$$x(4\lambda) + y(5\lambda) - (x + 4\lambda) - (y + 5\lambda) - 23 = 0$$

10

$$(-x - y - 23) + \lambda(4x + 5y - 9) = 0$$

5

∴ ස්පර්ශ ජායය $4x + 5y - 9 = 0$ හා $x + y + 23 = 0$ රේඛාවල ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හරහා යයි.

එය අවල ලක්ෂ්‍යකි.

5

10

30

17. (a) $0 \leq \theta \leq \pi$ සඳහා $\cos 2\theta + \cos 3\theta = 0$ පසුදැක්ව.

$\cos \theta$ ආදායමක් $\cos 2\theta$ හා $\cos 3\theta$ ලියා දැක්වූවහොත්, $\cos 2\theta + \cos 3\theta = 4r^2 + 2r^3 - 3r - 1$ බව පෙන්වන්න; මෙහි $r = \cos \theta$ වේ.

එ නිසා, $4r^3 + 2r^2 - 3r - 1 = 0$ සමීකරණයෙහි මූලයන් අතර ලියා දැක්වූවහොත් $4r^2 - 2r - 1 = 0$ සමීකරණයෙහි.

මූල $\cos \frac{\pi}{5}$ හා $\cos \frac{3\pi}{5}$ බව පෙන්වන්න.

$\cos \frac{3\pi}{5} = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}$ බව පෙන්වන්න.

(b) ABC ත්‍රිකෝණයක් ගැනි ද D යනු $BD : DC = m : n$ වන පරිදි BC මත වූ ලක්ෂ්‍යය ගැනි ද ගනිමු; මෙහි $m, n > 0$ වේ. $\angle BAD = \alpha$ හා $\angle DAC = \beta$ බව දී ඇත. BAD හා DAC ත්‍රිකෝණ සඳහා සයින නියමය භාවිතයෙන්, $\frac{mb}{nc} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ බව පෙන්වන්න; මෙහි $b = AC$ හා $c = AB$ වේ.

එ නිසා, $\frac{mb - nc}{mb + nc} = \tan\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \cot\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$ බව පෙන්වන්න.

(c) $2 \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{\pi}{2}$ බව පෙන්වන්න.

(5) (5)

(a) $0 \leq \theta \leq \pi$ සඳහා $\cos 3\theta = -\cos 2\theta = \cos(\pi - 2\theta)$

$$3\theta = 2n\pi \pm (\pi - 2\theta), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (5)$$

$$5\theta = 2n\pi + \pi, \quad n \in \mathbb{Z} \text{ or } \theta = 2n\pi - \pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$0 \leq \theta \leq \pi \text{ බැවින් විසඳුම් } \theta = \pi, \frac{\pi}{5} \text{ හා } \frac{3\pi}{5} \quad (5)$$

(5) (5) (5)

30

(5)

(5)

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 \text{ and } \cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

$$\therefore \cos 2\theta + \cos 3\theta = 4\cos^3\theta + 2\cos^2\theta - 3\cos\theta - 1$$

$$= 4t^3 + 2t^2 - 3t - 1, \text{ මෙහි } t = \cos\theta.$$

(10)

20

$\therefore 4t^3 + 2t^2 - 3t - 1 = 0$ හි මූලයන් $\cos \pi, \cos \frac{\pi}{5}$ හා $\cos \frac{3\pi}{5}$ (10)

$\cos \pi = -1 \Rightarrow t + 1$ යනු $4t^3 + 2t^2 - 3t - 1$ හි සාධකයකි.

$\Rightarrow 4t^3 + 2t^2 - 3t - 1 = (t + 1)(4t^2 - 2t - 1) = 0$ (10)


$\Rightarrow 4t^2 - 2t - 1 = 0$ හි මූලයන් $\cos \frac{\pi}{5}$ හා $\cos \frac{3\pi}{5}$. (5)

$t = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 + 4 \times 4 \times 1}}{2 \times 4} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$

$\cos \frac{3\pi}{5} < 0$ බැවින් $\cos \frac{3\pi}{5} = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}$. (5)

35

(b)



$BDA = \theta$ යැයි ගනිමු.

සහිත් ත්‍රිකෝණ භාවිතයෙන්:

$BAD \Delta: \frac{BD}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \theta}$ (10)

$ADC \Delta: \frac{DC}{\sin \beta} = \frac{b}{\sin(\pi - \theta)}$ (10)

$\Rightarrow \frac{(BD) \sin \beta}{(DC) \sin \alpha} = \frac{c}{b}$

$\Rightarrow \frac{mb}{nc} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ (5)

25

$$mb = nc \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

$$\Rightarrow \frac{mb - nc}{mb + nc} = \frac{nc \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} - nc}{nc \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} + nc} \quad (5)$$

$$= \frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}$$

$$= \frac{2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)} \quad (5)$$

$$= \tan\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \cot\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right).$$

(5)

20

(c) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \gamma$ හා $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = \delta$ යැයි ගනිමු. $0 < \delta, \gamma < \frac{\pi}{2}$.

$$(5) \quad 2\gamma + \delta = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 2\gamma = \frac{\pi}{2} - \delta$$

$\Leftrightarrow \tan(2\gamma) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right)$ ($\frac{\pi}{2} - \delta$ සුළු කෝණයක් බැවින්, 2γ ද සුළු කෝණයකි.)

$$\tan 2\gamma = \frac{2 \tan \gamma}{1 - \tan^2 \gamma} = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{3}{4} \quad (5)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) = \cot \delta = \frac{3}{4} \quad (5)$$

$$\therefore 2\gamma + \delta = \frac{\pi}{2}.$$

(5)

20

